


2.3 Le sida en chiffres.

L'épidémie de sida est devenue mondiale: actuellement, plus de 40 millions d'hommes et de femmes ont été infectés par le VIH. Chaque jour, l'infection touche 16.000 personnes supplémentaires.

Evolution des nouveaux diagnostics d'infection VIH en Belgique, par région, selon l'année.

Source: Institut Scientifique de Santé Publique, 2004



Toute la partie de l'Afrique située au sud du Sahara est la région du globe la plus touchée. Mais de nouveaux foyers se développent ailleurs : depuis 1999, ce sont les Etats de l'ex-URSS qui enregistrent la plus forte augmentation du nombre de séropositifs.

En Belgique, après la forte augmentation des années 80, le nombre de nouveaux séropositifs déclarés s'est stabilisé, a diminué de 1993 à 1997. Depuis 1997, on observe une nouvelle augmentation du nombre des cas (+49% entre 1997 et 2003).

En 2003, l'infection par le VIH a été diagnostiquée en Belgique chez 1032 personnes. C'est la première année que le nombre de nouvelles contaminations dépasse le cap des 1000 par an. Ce chiffre représente une moyenne de 86 nouveaux séropositifs par mois, soit 49% de plus qu'en 1997. Au 31 décembre 2003, depuis le début de l'épidémie, 16.922 personnes ont été diagnostiquées séropositives.

Quelque 3173 cas de malades du sida ont été notifiés au cours de la même période. Depuis 1996, le nombre de nouveaux cas de sida a diminué, grâce à l'utilisation de nouveaux traitements antirétroviraux.

De grandes variations.

Plus de la moitié des personnes nouvellement infectées sont des ressortissants de pays étrangers; parmi eux, les trois-quarts sont originaires de l'Afrique subsaharienne.

La transmission du VIH par voie hétérosexuelle est globalement dominante, mais on observe de grandes variations en fonction des groupes de population.

Chez les non-Belges des deux sexes, la transmission hétérosexuelle est largement majoritaire. La répartition du nombre de séropositifs entre hommes et femmes est relativement égale.

Chez les femmes belges, la transmission hétérosexuelle est dominante, mais le nombre d'hommes belges séropositifs est nettement plus important (80% des séropositifs belges). La majorité des contaminations d'hommes belges est due à des rapports homosexuels ou bisexuels.

Dans l'ensemble, les hommes sont touchés à des âges plus tardifs (surtout entre 30 et 34 ans) que les femmes (surtout entre 25 et 29 ans).

Il existe des groupes plus vulnérables à l'infection par le VIH : les personnes souffrant d'autres maladies sexuellement transmissibles, les usagers de drogues par voie intraveineuse, les prisonniers et, plus généralement, toutes les personnes en situation marginale ou précaire.