

NOME	SINTOMI	MODALITÀ DI TRASMISSIONE	DIAGNOSI	TERAPIA
<b>Condilomi, creste di gallo, verruche genitali (Papillomavirus umano)</b>	Escrescenze che assomigliano a delle verruche nella regione genitale, anale e orale	Per via sessuale o tramite contatto tra una mucosa e la regione infetta (petting)	Visita medica e Pap test	Applicazione di pomata sulle verruche e, qualora fosse necessario, intervento locale per rimuovere le verruche o intervento al laser
<b>Micosi vaginali, banalite (infiammazione del glande)</b>	Sensazione di prurito, perdite vaginali bianche di consistenza vischiosa, sensazione di bruciore, infiammazione del glande.	Per via sessuale, petting	Visita medica, tampone genitale e striscio	Farmaci mirati, pomata da applicare sulle mucose o ovuli vaginali
<b>Sifilide</b>	Piccola ferita o ulcera nella regione genitale, anale e orale. Ingrossamento delle ghiandole linfatiche, eruzioni cutanee, apparizione di macchie rosate	Per via sessuale, attraverso il contatto tra le mucose, anche senza penetrazione (contatto bocca-genitali e bocca-ano). Può anche essere trasmessa attraverso il bacio qualora ci fossero delle ulcere nella regione orale.	Esami del sangue	Antibiotici mirati. Il terzo stadio della malattia è quello più difficile da curare.
<b>HIV/AIDS</b>	Nella maggior parte dei casi non ci sono sintomi. A volte si presenta sotto forma di influenza.	Per via sessuale Attraverso il sangue Per via ereditaria (da madre a figlio)	Esami del sangue	Non esiste una terapia in grado di debellare la malattia. Tuttavia, è possibile rallentarne il decorso attraverso, per esempio, la triterapia.

## Contatti

**Namur : SASER**

<https://pointsrelaissida.jimdo.com> - 081/77.68.20

**Liège : Centre S**

[www.sidasol.be](http://www.sidasol.be) - 04/287.67.00

**Charleroi : Sida-IST Charleroi-Mons**

[www.sida-charleroi-mons.be](http://www.sida-charleroi-mons.be) - 071/92.54.10

**Zanzu**

<https://www.zanzu.be/fr/>

Pour trouver un centre de dépistage proche de chez toi, visite le site:

[www.cool-and-safe.org](http://www.cool-and-safe.org)

Éd. Resp. : Thierry Martin, Plateforme Prévention Sida  
Place de la Vieille Halle aux Blés 28/29 - 1000 Bruxelles

Tutti noi, in quanto genitori, parte di una coppia, membri della stessa comunità o esponenti religiosi, siamo tutti tenuti ad agire nell'ambito della prevenzione delle IST. Si tratta di una responsabilità collettiva.



Préservatif

Dépistage

Traitements

Plateforme Prévention Sida

Place de la Vieille Halle aux blés 29/28  
1000 Bruxelles

Tél: 02/733.72.99

[WWW.COOL-AND-SAFE.ORG](http://WWW.COOL-AND-SAFE.ORG)



Cool and Safe

## Lo sapevate?

**Les IST\***

\*Infezioni sessualmente trasmesse

Italiano



## Infezioni sessualmente trasmesse

Le IST o Infezioni Sessualmente trasmesse sono delle malattie che si trasmettono per via sessuale a seguito di un rapporto -con o senza penetrazione- con una o piu' persone portatrici.

Le IST sono provocate da batteri, virus, parassiti o funghi.

Le IST piu' diffuse sono: l'Epatite B e C, l'Herpes genitale, la Gonorrea, la Clamidia, la Sifilide, il Papillomavirus umano, l'HIV e l'AIDS...

Per alcune di queste infezioni, ad per esempio l'HIV, l'AIDS e le epatiti, la via sessuale non é l'unica modalit  di trasmissione. Infatti, esse possono anche essere trasmesse attraverso il sangue.

## Sintomi o manifestazioni

Spesso i sintomi delle IST sono piuttosto blandi; a volte sono addirittura assenti.

Se nelle settimane o nei mesi che seguono un rapporto sessuale dovessero apparire dei sintomi quali secrezioni genitali, perdite vaginali anormali e maleodoranti, sensazione di prurito o di bruciore alla minzione, pustole, escoriazioni ed ulcere sugli organi genitali o sulle altre mucose (come ad esempio quella orale e quella anale), dolori al basso ventre, perdite ematiche o qualsiasi altra manifestazione inabituale,   imperativo consultare un medico.

Anche se questi sintomi possono sembrarvi di poca importanza, sottovalutarli sarebbe un grave errore. Infatti, un' IST non diagnosticata e curata tempestivamente puo' avere delle gravi conseguenze a lungo termine (sterilit , diversi tipi di cancro...)..

Se invece sono diagnosticate in tempo, la maggiorparte delle IST sono facilmente curabili nel giro di qualche settimana.

Le IST indeboliscono le mucose, facilitando cos  la trasmissione dell'HIV. Inoltre, qualsiasi lesione genitale aumenta il rischio di contrarre l'HIV/ l'AIDS.

## Diagnosi

A seconda del tipo di IST, la diagnosi   stabilita grazie ad una serie di esami quali:

- esami genitali
- tamponi genitali o esami colturali
- esami del sangue

La diagnosi   effettuata dal medico curante e/o dal ginecologo per le donne, oppure in un consultorio, in un centro clinico o in un centro IST...

## Prevenzione

- utilizzare un preservativo maschile o femminile durante ogni rapporto sessuale,
- nel caso in cui abbiate contratto una IST, informate il vostro partner affinche possa consultare un medico e prendere le dovute precauzioni.
- Non improvvisatevi medico sperimentando delle cure che, a vostro avviso, potrebbero risolvere il problema. **CONSULTATE UN MEDICO!**

NOME	SINTOMI	MODALIT� DI TRASMISSIONE	DIAGNOSI	TERAPIA
<b>Gonorrea</b> (chiamata anche blenorragia. Popolarmente conosciuta come "scolo").	Secrezioni purulente dal pene, dolorie sensazione di bruciore alla minzione, perdite vaginali anomale, dolori durante la minzione	Per via sessuale	Tampone genitale, striscio	Antibiotici mirati
<b>Clamidia</b>	Secrezioni anomale, perdite vaginali	Per via sessuale, petting	Pap test per le donne, esame delle urine per gli uomini.	Antibiotici mirati
<b>Epatite B</b>	Molto spesso assenti. Sensazione di stanchezza, febbre.	Per via sessuale Attraverso il contatto con sangue infetto Per via ereditaria (da madre a figlio)	Esami del sangue	Vaccino combinato anti-epatite A e B.
<b>Epatite C</b>	Stanchezza, febbre, ittero Molte volte senza sintomi	Attraverso il sesso Con il sangue percorso madre-figlio	Esami del sangue	Antivirali, recupero in 8-12 settimane
<b>Herpes genitale</b>	Sensazione dolorosa o di bruciore, lesioni e vescicole sul pene o sulla vulva	Per via sessuale, tramite contatto tra le mucose, anche senza penetrazione (contatto bocca - genitali e bocca-ano) oppure tramite contatto diretto con le lesioni	Tamponi genitali e, in alcuni casi, esami del sangue	Pomata o trattamento antivirale mirato